



Fungistático y fungicida imidazólico tópico activo frente dermatofitos, levaduras, *Candida*, *M. furfur*. Además de su acción antifúngica, también actúa también sobre un gran número de cepas bacterianas grampositivas.

## **USO CLÍNICO**

- Crema al 2%. Dermatomicosis: *Tinea capitis*, *cruris*, *corporis*, *pedis*, *manus*, *faciei*, *barbae*, *unguium* (poco eficaz en onicomycosis); candidiasis cutáneas superficiales; balanitis, balanopostitis; onicomycosis: oniquia y paroniquia; pitiriasis versicolor; otomicosis por *Candida* en ausencia de lesión por perforación de tímpano; eritrasma; micosis sobreinfectadas por bacterias grampositivas.
- Óvulos vaginales 200 mg y 600 mg. Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta, causadas por especies de *Candida*.

## **DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN**

Crema al 2%: niños >10 años.

- Se recomienda la aplicación de la crema en la zona afectada mediante fricción 1-2 veces al día hasta su completa absorción. Duración del tratamiento: 2-4 semanas.
- En caso de *Tinea pedis* y onicomycosis, se recomienda continuar el tratamiento 1-2 semanas tras la desaparición de la lesión.

Óvulos vaginales 200 mg y 600 mg, adolescentes mayores de 16 años:

- 200 mg/24 h por la noche durante 3 noches.
- 600 mg en dosis única.

## **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad conocida al fenticonazol, a imidazoles en general o a cualquiera de los componentes de la especialidad.

## **PRECAUCIONES**

Evitar el contacto con los ojos. Lavar y secar minuciosamente la zona a tratar. No utilizar vendajes oclusivos o no transpirables. Este medicamento no debe ser utilizado junto con contraceptivos de barrera.

Uso en niños:

- Crema al 2%: no indicado en niños <10 años.

- Óvulos vaginales 200 mg y 600 mg: no indicados en niñas.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Ocasionalmente, efectos irritativos locales (<5% de los casos).

## **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**

No se han descrito.

## **DATOS FARMACÉUTICOS**

### **Excipientes:**

- Crema al 2%: propilenglicol 5 g, lanolina hidrogenada 1 g, aceite de almendra dulce 10 g, ésteres poliglicólicos de ácidos grasos 15 g, alcohol cetílico 3 g, monoestearato de glicerilo 3 g, edetato sódico 0,5 g y agua purificada 60,5 g.
- Óvulos 200 g: triglicéridos de ácidos grasos saturados 390,0 mg, dióxido de silicio coloidal 10,0 mg, gelatina 185,0 mg, glicerina 90,0 mg, dióxido de titanio 3,8 mg, etil p-hidroxi benzoato de sodio 0,8 mg, propil p-hidroxi benzoato de sodio 0,4 mg.

**Presentaciones comerciales:** las presentaciones disponibles en España pueden consultarse en línea en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), <http://www.aemps.gob.es/cima>, y en <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum> en el enlace "Presentaciones" correspondiente a cada ficha.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Fichas técnicas del Centro de Información *online* de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [consultado en diciembre de 2020]. Disponible en: <https://cima.aemps.es/cima>
- Clotrimazole: Pediatric drug information. UpToDate (Pediatric drug information) [base de datos en Internet]. Waltham, MA: Wolters Kluwer Health Clinical Solutions 2021. Disponible en: [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)
- Moraga Llop FA, Cabañas Poy MJ. Guía de antiinfecciosos en Pediatría 2010. Barcelona: Prous; 2010.
- Villa LF (ed.). Medimecum, guía de terapia farmacológica. 16.ª edición. España: Adis; 2011.

**Fecha de actualización:** diciembre de 2020.

**La información disponible en cada una de las fichas del Pediamécum ha sido revisada por el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y se sustenta en la bibliografía citada. Estas fichas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).**