

M. Moya

An Esp Pediatr 1997;47:120.

Erradicación de la polio en España

La Organización Mundial de la Salud tiene planeado para el año 2000, declarar a la Región Europea como zona libre de poliomielitis. Este es un escalón fundamental y previo para conseguir la erradicación mundial de la poliomielitis, de forma similar a lo que ocurrió con la viruela hace sólo unos pocos años, tras milenios de padecimiento de la misma.

Esta buena noticia sanitaria que afecta a España, requiere una colaboración firme por parte de los pediatras y ello es lo que motiva este Editorial.

En nuestro país, la vacunación antipoliomielítica con carácter masivo se inició en 1963 y desde 1989 no se ha declarado ningún caso. El índice de cobertura vacunal es claramente superior al 95%, lo cual da idea del alto grado de concienciación del pediatra, de las familias y de la Administración.

Sin embargo, para poder hablar con rigor de erradicación es necesario que todo caso de parálisis flácida aguda (PFA) pueda demostrarse que no está producido por un poliovirus. La población de menos de 15 años de edad, nuestro campo natural de trabajo, constituye el núcleo fundamental de estudio por la incidencia mayoritaria de esta terrible enfermedad y de otras parálisis.

El Ministerio de Sanidad constituyó un Grupo de Trabajo para desarrollar el Plan de Erradicación de la Poliomielitis, en el que, junto con otros estamentos y sociedades, participa la Asociación Española de Pediatría. El plan de acción de la OMS vehiculado por este Grupo de Trabajo consiste en identificar los casos de parálisis flácida aguda, así como realizar valoración analítica de productos biológicos según una secuencia claramente establecida para demostrar que no estén implicados poliovirus en la génesis de la misma.

Por todo ello, le ruego encarecidamente que ante cualquier situación de PFA que detecte, lo envíe haciendo constar esta sospecha al Servicio de Pediatría de su hospital de referencia, para que una vez allí se ponga en marcha este laborioso programa. Asimismo, a los pediatras que trabajan en el ámbito hospitalario, quiero significar la importancia que, ante cualquier caso de sospecha de PFA, sigan estrictamente el protocolo de actuación y notificación que les será proporcionado en el Hospital.

Deseo expresar el convencimiento de que el esfuerzo de todos puede fructificar y confirmar una España sin polio en el año 2000, con las ventajas sanitarias que ello supondrá para nuestra población.